



อาหารและน้ำดื่มปกติ แต่ต้องระมัดระวังและไม่คลุกเคลือดวัย ถ้าสัตว์มีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที และถ้าสัตว์ด้วยในระหว่างนี้ให้ตัดหัวทั่งตรง ในการตัดหัวสัตว์ส่งตรวจนั้นควรสวมถุงมือกันน้ำหรือใช้ถุงพลาสติกหุ้มมือขณะทำการตัด (ผู้ที่ไม่ชำนาญแพลตที่มือไม่ควรแตะต้องสัตว์นั้น) และนำอุจุนพลาสติกครอบส่วนหัวสุนัขก่อนใช้มีคุณๆ ตัดครองร้อยชั้นดีต่อระหว่างหัวกับคอ และนำใส่ถุงพลาสติกหนาๆ อีกชั้นหนึ่ง รัดปากสุนัขให้แน่นและใส่ภาชนะที่มีความเย็น เข็น กระติกที่มีน้ำแข็งอยู่ เพื่อกันไม่ให้เน่า รีบส่งห้องปฏิบัติการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทันที

6. เมื่อพบเห็นลุนัข หรือสัตว์ที่มีอาการที่คิดว่าจะเป็นโรคนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเทศบาลทราบ โดยด่วน เพื่อดำเนินการกำจัดโดยการติดตามสุนัขและถอนฟันที่ถูกสูบด้วยกัด ข่วน และควบคุมโรคในบริเวณโดยรอบ

7. ถ้าพบถูกสูบด้วยกัดควรแนะนำให้รีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สูบด้วยกัด หรือสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลโดยเร็ว



องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



ទំនាក់ទំនងក្រុមការប្រតិបត្តិរដ្ឋបាល

สาธารณสุขเผยแพร่พิมพ์สุนัขบ้าคร่าชีวิต
ชาวโลกทั่วโลก 6 คน ตั้งเป้ากำจัดโรคนี้

ให้หมดใน 10 ปี

สาธารณสุขเผยแพร่เสียงวิจารณ์โกรกพิมสุนัข บ้ำทั่วโลกปีละไม่ต่ำกว่า 55,000 ราย ร้อยละ 95 เกิดในแอฟริกา และ เอเชีย ในไทยส่วนใหญ่มีผู้เสียชีวิตด้วยโกรกพิมสุนัขบ้ำ ปีละ 10-20 ราย ผู้ต้องกักตัวส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี สาเหตุค่าว่าร้อยละ 80-90 เป็นสุนัขมีเจ้าของ โดยคาดว่าทั่วประเทศจะมีสุนัขทั่วไปเลี้ยงในบ้านและเขตประมาณ 8 ล้านตัว รัฐบาลต้องเสียงประมานกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท ในการ

ควบคุมโรคทั้งในคนและสัตว์ ตั้งเป้ากำจัดโรคนี้ให้หมดภายในปี พ.ศ.2563 หรือ ก.ศ. 2020

สาเหตุและอาการของโรค

เกิดจากเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงดูทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์เลี้ยงลูกหึ่งน้ำนมติดต่อมาต่อกัน โดยบุกสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วนหรือสักว์เลี้ยงบริเวณที่มีแผล รอบช่วง หรือน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ที่นำโรค ได้แก่ สุนัข แมว ทั้งสัตว์เลี้ยง เช่น หมู ม้า วัว เป็นต้น ส่วนใหญ่จะมีอาการประกายหลังจากการรับเชื้อ 15-60 วัน

อาการที่สำคัญของโรคในคน เริ่มคุ้ยอาการ
ปวดศีรษะ มีไข้ต่ำ ๆ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว เป็นอยู่
อาหาร อ่อนเพลีย คันบริเวณน้ำดีอุดตัน ซึ่งแพลงค์
อาจหายสนิทไป อาการกลืนลำบาก เพราะกล้ามเนื้อที่
ลักษณะคล้ายเสียงหดและเกร็งตัว อย่างคั่นน้ำแต่
กลืนไม่ได้ทำให้มีอาการกลืนลำบาก น้ำลายฟูมปาก บ้วน
น้ำลายบ่อย กระวนกระวาย ตื่นตัน ประสาทสัมผัส
จะไวต่อการกระซุน กล้ามเนื้อแขนขาเกร็ง
กระตุก ระยะหลังจะเป็นอัมพาตหนาดศีรษะและเสียชีวิต
ภายใน 2-7 วัน นับจากเริ่มแสดงอาการ

การป้องกัน

- 1.นำสัตว์เดี่ยงไปนิคิวชันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง แต่สุนัขที่นิคิวชันครั้งแรกควรนัด 2 ครั้ง (ห่างกัน 1-3 เดือน) เพื่อขอต้องนำสุนัขไปรับการนิคิวชันเข็มแรงเมื่อสุนัขอายุ 2-4 เดือน

2. ระวังบุตรหลานไม่ให้เล่นกับกลิ่นสุนัข
หรือสัตว์ร้ายที่บังไม่ได้ฝึกวินัยหรือไม่ทราบประวัติ
การฝึกวินัย

3. ควรทึ่งขยะ เศษอาหารในที่มีฝาปิด
มิดชิด หรือกำจัดโดยการส่ง หรือเผา เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของสุนัขจรจัด

4. เมื่อถูกสูนักกัดหรือสักวิเล็บถูกกัดวัยนุ่ม กัดให้รับลางแพลด้าบวน้ำสนุ่นและน้ำสะอะคาดอลายฯ ครั้ง เชื้อกัดให้แห้งแล้วใส่สารละลายไอโอดินที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อชั่วขณะ โพวีเด็น พ้อ้มทั้งติดตามหาเจ้าของสูนักที่กัดเพื่อสอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประวัติการของสุนัขเพื่อเฝ้าสังเกตด่อไป แล้วรีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ใกล้กับที่อยู่เพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนและอีมูนูโน่โกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด

5. ควรกักขังสูนขหรือแมวที่กัดไว้เพื่อศึกษาการอยู่่างน้อย 10 วัน โดยในระหว่างนี้ควรให้ยาปฏิชีวนะและดูแลอย่างดี